


# **«Optiskais starojums: īpašības, avoti un ietekme uz cilvēka veselību»**

Vitalijs Rodins, M.Sc.,  
Žanna Martinsone, Dr.med.,  
Darba drošības un vides veselības institūts,  
Rīgas Stradiņa universitāte  
Rīga, 12.04.2016.

# Prezentācijas saturs

- 1. Kas ir optiskais starojums?**
- 2. Infrasarkanais starojums (IS)**
- 3. Redzamā gaismā**
- 4. Ultravioletais starojums (UV)**
- 5. Lāzeru drošība un klases**

# Kas ir optiskais starojums?



Darba aizsardzības vadlīnijas: darba aizsardzības prasības nodarbināto asizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē. RSU DDVVI, SIA Darba Medicīna; Rīga, 2006.

# Kas ir optiskais starojums?

- Optiskais starojums ir **elektromagnētisks starojums**, kas ietver sevī šādus viļņa garumu diapazonus:
  - Infrasarkanais starojums ( $1 \text{ mm} - 700 \text{ nm}$ )**
  - Redzamā gaisma ( $700 \text{ nm} - 400 \text{ nm}$ )**
  - Ultravioletais starojums ( $400 \text{ nm} - 10 \text{ nm}$ )**

# Infrasarkanais starojums (IS)

- IS emitē jebkurš objekts karstāks par apkārtējo vidi
- Objekta apstarošana ar IS izraisa tā **sasilšanu**
- IS stari tiek absorbēti uz ķermēņa virsmas vai nelielā dziļumā, tāpēc **āda un acis** ir visvairāk pakļauti IS starojuma riskam



Attribution: Cody.pope at the English language Wikipedia. License type: CC BY-SA 3.0

# Infrasarkanais starojums (IS)


- IS starojums ir bīstams tikai pie **lielas intensitātes** vai **koncentrēta stara**. Sadzīves IS avoti (tālvadības pultis, gāzes plītis, ugunskurs, radiatori) **nerada risku veselībai**
- IS riska avoti darba vidē:
  - » Sakarsēts līdz kvēlei jeb izkausēts metāls un stikls
  - » Kausēšanas un dedzināšanas krāsnis
  - » IS lāzeri
  - » Saule



# Infrasarkanais starojums (IS)

## ■ IS starojuma ietekme uz cilvēka veselību:

- » **Āda:** intensīva apstarošana var izraisīt termisku apdegumu
- » **Acis:** iedarbojoties uz **konjunktīvu**, IS starojums var izraisīt iekaisumu vai asiņošanu. Pēc ilgstošas ekspozīcijas IS izraisa kataraktas **lēcā** un var novest līdz aklo plankumu veidošanos **tīklenē**



# Redzamā gaisma

- Redzamas gaismas avoti ir sastopami visapkārt: lampas, ekrāni, uguns, saule. Bet bīstamību rada tikai **ļoti spilgta gaisma** (jaudīgas lampas, elektriskās izlādes, metināšana) vai **koncentrēts stars** (lāzeri)
- IS staru termiskie efekti uz cilvēka veselības attiecās arī uz redzamo gaismu, bet parādās pie stipri lielākām intensitātēm, jo gaismas termiska iedarbība ir vājāka, nekā IS

# Redzamā gaisma

## ■ Redzamās gaismas ietekme uz cilvēka veselību:

- » **Ādas fotosensibilizācija** – paaugstināts jutīgums pret gaismu, ko izraisa noteiktas ķīmiskās vielas (piem., dažu antibiotiku blakusefekts)
- » **Fotoalerģiska reakcija** – imūnsistēmas reakcija uz antigēnu gaismas iedarbībā (individuāli)
- » **Fotoķīmisks tīklenes bojājums** no spilgtas zilas gaismas (300-550 nm – robeža ar UV) vai **hroniskas ekspozīcijas** spilgtai gaismai

# Ultraviolets starojums (UV)

- Iedala trīs apakšdiapazonos:
  - » **UVA** (315-400 nm)
  - » **UVB** (280-315 nm)
  - » **UVC** (100-280 nm)
- UV starojuma avoti ir specifiski: UV lampas (solāriju, dezinfekcijas utt.) un lāzeri, elektriskās izlādes (metināšana, zibens), saule

# Ultraviolets starojums (UV)

- Saules **UVC** starojumu bloķē atmosfēras ozona slānis, bet tā **mākslīgie avoti** joprojām rada risku
- Saules UV starojums **iet cauri viegliem mākoņiem** un rada papildus ekspozīciju **atstarojoties no ūdens virsmas, sniega un smiltīm!**




Attribution: Jessie Eastland at the English language Wikipedia. License type: CC BY-SA 3.0

# Ultraviolets starojums (UV)

## ■ UV ietekme uz veselību:

- » Acīs izraisa **fotokeratītu** – iekaisums un «**smilšu**» **izjūta acīs** 1-24 h pēc ekspozīcijas. Parasti pāriet 1-2 dienu laikā. Var arī izraisīt **kataraktu**
- » Uz ādas iespējama **fotosensibilizācija** un **fotoalerģiska reakcija**
- » Ādas **UV apdegumi** (saules apdegumi) – nav termiski, parādās 1-6 h pēc ekspozīcijas
- » Paaugstināts **ādas vēža** risks

# Lāzeru drošība un klases



- Lāzeru optiskais starojums veido **koncentrētus intensīvus starus**, kas neizklīst ar attālumu. Parasti lāzeri emitē tikai **viena viļņa garuma** starojumu
- Koncentrēts lāzerstarojums rada **lielāku** risku nokļūstot acīs, uz ādas vai materiāla virsmas, salīdzinot ar izkliedēta starojuma avotu. No otras puses, varbūtība nejauši iekļūst smaila stara (vai tā atstarojuma) ceļā cilvēkam ir **mazāka**

# Lāzeru drošība un klases



- Lāzerstarojuma avotu klases pēc **IEC 60825-1:2014** standarta (atkarībā no emitēta **viļņa garuma** un **intensitātes**)
  - » **Klase 1:** drošs jebkuros normālas lietošanas apstākļos
  - » **Klase 1M:** ekspozīcijas līmenis var tikt pārsniegts, ja stars ir laists caur palielinošu optiku
  - » **Klase 2:** skaitās drošs, jo aci no ilgstošas iedarbības pasargā mirkšķināšanas reflekss
  - » **Klase 2M:** drošs mirkšķināšanas refleksa dēļ, ja netiek lietoti optiskie instrumenti
  - » **Klase 3R:** drošs pie uzmanīgas izmantošanas un ar ierobežotu stara vērošanas iespēju
  - » **Klase 3B:** bīstams tieši iekļūstot acīs, bet nerada risku atstarojoties no matētām virsmām
  - » **Klase 4:** var apdedzināt ādu vai nopietni bojāt acis, arī atstarojoties

# Informācijas avotu saraksts

- » MK noteikumi nr. 731«Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret mākslīgā optiskā starojuma radīto risku darba vidē» [LV]
  - » Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/25/EK par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba nēmēju pakļaušanu riskiem, ko izraisa fizikāli faktori (mākslīgais optiskais starojums) [LV] vai [EN]
  - » Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2006/25/EK īstenošanu (mākslīgais optiskais starojums) [LV] vai [EN]
  - » ICNIRP vadlīnijas par ekspozīcijas robežām ultravioleta starojumam ar vilņa garumiem starp 180 nm un 400 nm (nekoherents optiskais starojums) [EN]
  - » ICNIRP vadlīnijas par ekspozīcijas robežām nekoherentam redzamajam un infrasarkanajam starojumam [EN]
  - » ICNIRP vadlīnijas par ekspozīcijas robežām lāzera starojumam ar vilņa garumiem starp 180 nm un 1000 μm [EN]
- 
- » **RSU DDVVI Higiēnas un arodslimību laboratorija**

# **Pateicos par Jūsu uzmanību!**